

## **Metroragia – algoritm diagnostic si terapeutic**

*Manuela Neagu\**, *Corina Moisa\*\**, *Dana Predescu\*\**, *Alina Frangulea\*\**, *Oana Podasca\*\**,  
*Izabela Ogneru\*\**

*Spit. Clinic de Obst. Gineco. 'Prof. Dr. Panait Sirbu' Bucuresti*

*\* Obstetico-Ginecologie I, UMF 'Carol Davila' Bucuresti*

*\*\* Anestezie – Terapie Intensiva*

Hemoragia este unul dintre cele trei sindroame cardinale ginecologice, alaturi de durerea pelvina si leucoree. Metrорagia reprezinta sangerarea pe cale vaginala care are ca punct de plecare uterul si care apare intre menstrе, aceasta afectand 10 - 30% dintre femeile de varsta fertila, fiind mai des intalnita in perimenopauza si mai rar dupa menopauza.

Metrорagia se poate datora tulburarilor de ciclu menstrual (disfunctii ale axului hipotalamo – hipofizo – ovarian, tumori estrogeno-secretante, chiste ovariene voluminoase), leziunilor organice (endometrita de diverse cauze, polipul endometrial, cervicita, hiperplazia de endometru, fibromatoza uterina submucoasa, adenomioza, adenocarcinomul de endometru, carcinomul cervical) sau unor afectiuni sistemice (administrarea de steroizi, endocrinopatie, coagulopatie, insuficienta renala, insuficienta hepatica). Metrорagia aparuta in cursul sarcinii are drept cauza in prima jumatate a sarcinii: avortul, sarcina ectopica sau boala trofoblastica gestationala, iar in a 2-a jumatate a sarcinii: decolarea prematura de placenta normal inserata, placenta praevia sau ruptura uterina.

Particularitati ale algoritmului diagnostic sunt reprezentate de detalierea in cadrul anamnezei a antecedentelor fizilogice personale si a celor obstetricale, dozari hormonale pentru evaluarea functiei hipofizo - ovariene si tiroidiene, asocierea histeroscopiei la investigatia imagistica de rutina – ecografia transvaginala, precum si prelevarea de biopsii endometriale si endo-/ exocervicale.

Tratamentul metrорagiei de cauza ginecologica poate fi medicamentos (terapie estrogeno-progestativa orala/transdermica, terapie progestativa continua orala/ injectabila/ prin dispozitiv intrauterin sau ciclica, analogi de GnRH) sau chirurgical (chiuretaj instrumental sau aspirativ, histeroscopie, laparotomie, laparoscopie, embolizarea arterelor uterine). In cazul metrорagiei obstetricale tratamentul este de cele mai multe ori chirurgical.